

Att tänka på vid early cannulation graft – första två veckorna

- **Använd steril teknik vid start och avslut – det är ett oläkt operationssår!** (sterila handskar, munskydd, steril rock och sterilt underlägg)
- Informera även patienten om noggrann hygien, ev. tvätta armen före punktion med tvål och vatten!
- Använd 17 gauge nål, en mindre nål gör mindre skada på graftet
- Punktion med vinkel, så att de olika lagren kan sluta sig (nålsögat ned "bevel down")
- Viktigt att nålen dras ut i samma vinkel som den punkterades, d.v.s. vreds nålen efter punktionen ska den vridas tillbaka innan den dras ut
- Reducera blodflödet (200 – 250 ml/min), lägre blodflöde ger mindre påverkan på graftet
- Ge en lägre dos av antikoagulantia, förhindrar blödning från incisionerna
- Komprimera 15-20 minuter efter nåldragning, förhindrar blödning in i subcutan vävnad
- **Endast ett fåtal erfarna sjuksköterskor ska punktera graftet** - sjuksköterskorna får kännedom om graftet och en ökad trygghet för patienten
- Undvik svullnad - informera patienten och sjukgymnasten
- Efter två veckor kan 15 gauge nål användas och punktionen ske enligt gällande rutiner

