

## **Information till dig inför rutinmässig diagnostik av bakterien *Helicobacter pylori* i magen**

معلومات لك قبل التشخيص الروتيني لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة

الفحص سهل و غير ضار\*

يجب عليك الصيام لمدة 6 ساعات بالنسبة للطعام الصلب وساعتين بالنسبة للسوائل الصافية

يجب عليك ايضاً عدم التدخين أو شرب المشروبات الغازية قبل الاختبار بساعتين

احد الموظفين سوف يوجهك لتعمل فحص التنفس، مما يعني

- الجلوس
- تأخذ نفساً عميقاً واحبسه لمدة 3 ثوان
- انفخ كمية صغيرة من الهواء خارج الفوهة. ملاحظة! لا تأخذ نفساً آخر
- في نفس النفس ، انفخ في الفوهة حتى يمتلئ الكيس
- ابتلع قرص دياباكت 50 ملغ. لا يحتوي على دواء فعال ولكن فقط مادة اليوريا الخاصة بالجسم وعامل الربط
- انتظر 10 دقائق على الأقل

• ثم يتم تكرار عملية النفخ على الجانب الآخر من الكيس

نتيجة الاختبار متاحة بعد وقت قصير من الاختبار. إذا كانت لديك هذه البكتيريا في معدتك ، فستعالج بدواء لالتهاب والأدوية المثبطة للأكسجين في المعدة لمدة أسبوع

