

Informazione sullo screening per l'infezione gastrica da Helicobacter pylori

- Il test é semplice e privo di rischi
- Il test richiede che tu sia a digiuno da sei ore e che tu non abbia ingerito liquidi nelle ultime due ore. Inoltre é vietato il fumo di sigaretta nelle due ore precedenti al test.

Riceverai istruzioni dal personale su come eseguire il test da espirazione. Il test viene eseguito nella maniera seguente:

- In posizione seduta, inspira profondamente e trattieni il respiro per 3 secondi
- Espira una piccola quantità d'aria al di fuori dell'apparato (questo senza inspirare nuovamente!)
- Continua ad espirare, questa volta dentro l'apparato, facendone gonfiare la bustina finché questa é piena d'aria
- Ingerisci la compressa di Diabact 50 mg. Questa compressa non contiene alcun farmaco, solo Urea (sostanza prodotta dal corpo) e agente legante
- Aspetta almeno 10 minuti
- Ripeti la procedura con l'espirazione, questa volta verso l'altro lato della bustina

Il risultato del test é accessibile dopo breve tempo. Nel caso il test riveli la presenza di Helicobacter pylori nello stomaco, l'infezione verrà trattata con antibiotici e farmaci che riducono l'acidità gastrica.

