



En dag om matstrups- och
magsäckscancer

– vägen framåt

28 september 2023

Uppföljning efter behandling

Jesper Lagergren

**Professor/överläkare i kirurgi, Karolinska
Institutet och King's College London**



**Karolinska
Institutet**

Bakgrund

- Tumöråterfall är vanligt de första åren efter behandling för cancer i matstrupe eller magsäck
- Behandlingsmöjligheterna vid tumöråterfall har utvecklats, t.ex. immunoterapi
- Oklart vilken uppföljning som ger bäst överlevnad, livskvalitet och hälsoekonomi
- Saknas evidensbaserade riktlinjer för uppföljning i Sverige och internationellt
- Stora skillnader

Slutsats: Behov av evidens → Stor randomiserad kontrollerad studie



**Karolinska
Institutet**

Studiens frågeställning

Leder uppföljning med regelbundna undersökningar med röntgen och gastroskopi till:

- Tidigare upptäckt av tumöråterfall?
- Bättre överlevnad?
- Bättre livskvalitet?
- Kostnadseffektivitet?



**Karolinska
Institutet**

Studiens metod

- Randomiserad kontrollerad studie
- Patientmedverkan
- Inklusion: Patienter tillfrågas om att delta vid lämpligt tillfälle efter operation (4-8 veckor)
- Grupp 1: Röntgenundersökning var 6:e månad och gastroskopi efter 12 månader
- Grupp 2: Undersökningar vid symtom som inger misstanke om tumöråterfall
- Vad som studeras: 3-årsöverlevnad, tumöråterfall, livskvalitet, hälsoekonomi



Studiens plan

- 952 patienter totalt, 476 i varje grupp
- Länder: England, Irland, Sverige och andra nordiska länder, ev. fler
- Tidsplan: Inklusionsperiod i 2 år (2023-2025) och uppföljningsperiod i 3 år (2028)
- Nuvarande status: Inklusionen av patienter har börjat i England, hittills 31 patienter från 3 centra



**Karolinska
Institutet**

Studiens betydelse

Resultaten (oavsett vilka) kan påverka uppföljningen efter behandling för cancer i matstrupe eller magsäck



**Karolinska
Institutet**