

Deliberate self-harm and ethnicity in the city of Sarajevo; Bosnia and Herzegovina

14. War, natural disasters, climate changes and other public

Emina Music^{1, 2}, *Ellinor Salander Renberg*¹

¹ Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri

² Psykiatriska kliniken, NU sjukvården, Trollhättan

Abstract text

Syftet med föreliggande studie är att undersöka avsiktligt självskadebeteende (DSH) i Bosnien och Hercegovina, med särskild hänvisning till kön, ålder och etnicitet. Mellan 2001 och 2003 övervakades kända sjukhusfall av DSH hos personer som var 15 år eller äldre i Sarajevoområdet med hjälp av standardiserade metoder. Totalt registrerades 1428 DSH-händelser, vilket ger en årlig genomsnittlig DSH-händelsefrekvens på 119 per 100 000 (118 för kvinnor, 120 för män) och en DSH-personfrekvens på 110 (108 för kvinnor, 111 för män). Den genomsnittliga personbaserade DSH-frekvensen var 124 för bosniaker (muslimer), 128 för kroater (katoliker) och 88 för serber (ortodoxa kristna). Självförgiftning var den vanligaste metoden i alla tre etniska grupperna (66 %), medan den näst vanligaste metoden självskada med ett vasst föremål (17 %). En mycket låg andel använde vapen eller sprängämnen. Frekvensen av DSH i Sarajevo under den studerade perioden var jämförbar med den i många andra regioner i Europa, men med ett ganska unikt mönster av högre nivåer bland män. Vi identifierade fluktuerande men signifikant inte skillnader mellan olika etniska grupper. Den allmänna uppfattningen att religiös tillhörighet är avgörande för nivån av DSH-nivåer stöddes inte av resultaten av denna studie; Snarare återspeglades efterkrigssituationen med enorma demografiska förändringar i resultaten. Störningar i den sociala integrationen som en följd av kriget föreslås som möjliga förklaringar.