

Gemensamma kriterier som måste uppfyllas för alla tre diagnoser:

1. Smärtan uppstår minst 4 tillfällen per månad
2. Symtomen har varat i minst 2 månader
3. Symtomen kan inte förklaras av annat medicinskt tillstånd

Funktionell dyspepsi	Irritabel tarm (IBS)	Funktionell buksmärt
<b>Ett eller flera</b> av följande: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postprandiell uppkördhet (känsla av fullhet efter måltid)</li><li>2. Tidig mättnadskänsla</li><li>3. Epigastrisk smärta eller brännande känsla som inte är kopplad till avföring</li></ol>	<b>Ett eller flera</b> av följande: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Smärtan är relaterad till tarmtömning</li><li>2. En förändring i avföringsfrekvens <i>eller</i> -konsistens</li><li>3. Hos barn med buksmärt och förstoppning försvinner inte smärtan när förstoppningen behandlas</li></ol>	<b>Alla</b> följande: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Episodisk eller kontinuerlig buksmärt som inte enbart uppträder under fysiologiska händelser (t.ex. måltider, menstruation)</li><li>2. Otillräckliga kriterier för irritabel tarm (IBS), funktionell dyspepsi eller bukmigrän</li></ol>
K30.9	K58.1, K58.2, K58.3	K59.8